

Nível: Superior

Área: Analista em Saúde/ Odontólogo Periodontista

### QUESTÃO 46

**Situação: Improcedente**

RECURSO:

“Há possibilidades de existir PSEUDO-BOLSAS...que significam bolsas periodontais falsas...E UM PERIODONTO NORMAL principalmente em terceiros molares e em casos de sorriso gengival...é comum essas condições clínicas.esta questão deveria ser anulada”.

JUSTIFICATIVA:

A questão 46 pede que seja assinalada a alternativa correta em relação ao periodonto saudável, e tem como resposta a alternativa “(D) não existem bolsas periodontais”. A questão não faz referência a bolsas gengivais ou “pseudo-bolsas”, e sim a “bolsas periodontais”, portanto o gabarito permanece como está.

*“A bolsa periodontal, definida como um sulco gengival patologicamente aprofundado, é uma das características mais importantes da doença periodontal. Todos os diferentes tipos de periodontites descritos no Capítulo 4 têm em comum características histopatológicas, como alterações teciduais na bolsa periodontal, mecanismos e destruição tecidual e mecanismos de cicatrização, Eles diferem, entretanto, na sua etiologia, história natural, progressão e resposta à terapia.<sup>32</sup> “O aprofundamento dos sulcos gengivais pode ocorrer pelo deslocamento apical da inserção gengival ou por uma combinação dos dois processos (Fig. 13-1). Bolsas podem ser classificadas da seguinte maneira: bolsa gengival (pseudobolsa) é formada pelo aumento gengival sem destruição dos tecidos periodontais subjacentes. O sulco é aprofundado devido ao aumento do volume da gengiva (Fig. 13-2, A). Bolsa periodontal ocorre com a destruição dos tecidos periodontais de suporte, levando à perda e esfoliação dos dentes.”<sup>1</sup>*

Fontes Bibliográficas:

1- Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza Periodontia Clínica. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1208 p.

2- LindheJ, Lang NP, Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 15th ed. John Wiley & Sons, 2009. 1448 p.

### QUESTÃO 49

**Situação: Procedente**

RECURSO:

“Prezada Banca, peço a anulação de tal questão pois na alternava A considerada correta está grafado incorretamente o item VI(seis) que não existe entre as afirmativas, quando o correto deveria ter sido item IV(quatro)”

JUSTIFICATIVA:

A questão 49 deverá ser anulada pelo erro de grafia na alternativa correta “A”. Onde se lê “(A) apenas II, III, VI e V”, deveria estar grafado “(A) apenas II, III, IV e V”.

Fontes Bibliográficas:

1- Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza Periodontia Clínica. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1208 p.

2- Lindhe J, Lang NP, Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 15th ed. John Wiley & Sons, 2009. 1448 p.

## QUESTÃO 52

**Situação: Procedente**

RECURSO:

“A primeira assertiva I- Ação prolongada do agente microbiano que é liberado lentamente. A afirmativa agente microbiano deveria ser substituída por agente **ANTIMICROBIANO** (antibiótico) e não microbiano (bactéria) como se encontra redigido na questão. O que induz o candidato ao erro.”

JUSTIFICATIVA:

A questão 52 deverá ser anulada pelo erro de grafia na alternativa correta “I”. Onde se lê “(I) Ação prolongada do agente microbiano que é liberado lentamente”, deveria estar grafado “(I) Ação prolongada do agente antimicrobiano que é liberado lentamente”.

Fontes Bibliográficas:

1- Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza Periodontia Clínica. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1208 p.

2- Lindhe J, Lang NP, Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 15th ed. John Wiley & Sons, 2009. 1448 p.

## QUESTÃO 59

**Situação: Procedente.**

RECURSO:

“Prezada Banca, peço mudança da alternativa correta de B para C, sendo que a afirmação III referente ao uso do anestésico de longa duração Bupivacaína **PODE SER** usado em procedimentos cirúrgicos periodontais de curta duração, pois não tem contra indicação e sim promoveria apenas um maior período de analgesia pós-operatória dando maior conforto ao paciente. **Portanto a alternativa correta seria a B.**”

JUSTIFICATIVA:

Na questão 59 a alternativa correta é a letra B, pois o anestésico bupivacaína associado ao vasoconstritor epinefrina pode ser utilizado em procedimentos cirúrgicos de curta duração.

Fontes Bibliográficas:

1- Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza Periodontia Clínica. 11<sup>a</sup> Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1208 p.

2- LindheJ, Lang NP, Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 15th ed. John Wiley & Sons, 2009. 1448 p.